

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2021(2022)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2021(2022)
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2021(2022)

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I, II
விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் I, II
Agriculture and Food Technology I, II

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 කි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I


උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් කිවරේදී හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගන්න.
- * මෙවල සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති තව අතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන සවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- * එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.


- ජනප්‍රවාදයට අනුව වෙල් (කුහිරු) ලක්ෂයක් තිබුණු නිසා 'වෙල්ලක්ක' යනුවෙන් හඳුන්වන ප්‍රදේශය පිහිටා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ,
(1) මධ්‍යම පළාතේ ය. (2) වයඹ පළාතේ ය.
(3) සබරගමු පළාතේ ය. (4) උතුරු පළාතේ ය.
- අනුශාසනාත්මක, පොදුමානවත්ව හා මුදාහරණය යන දීප්තිමත්කමට වාර්ෂිකව වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනුයේ,
(1) පිහාන දිග මෝසම් වර්ෂාව මගිනි. (2) සංචාන වර්ෂාව මගිනි.
(3) නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව මගිනි. (4) වාසුළු වර්ෂාව මගිනි.
- පස පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.
A - පාංශු ද්‍රාවණයේ අඩංගු H^+ සාන්ද්‍රණය OH^- සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි නම් එම පස ආම්ලික වේ.
B - පසක ආම්ලිකතාව උදාසීන කිරීමට කැල්සියම් කාබනේට් යෙදිය හැකි ය.
C - ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ බහුලවම ඇත්තේ රතු මුහුරු පසයි.
මෙවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
(1) A සහ B පමණි. (2) A සහ C පමණි. (3) B සහ C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ලම ය.
- සිසුන් කිහිපදෙනෙකු විසින් පස් වර්ග පිළිබඳව කරන ලද පරීක්ෂණයක ආවුරුම් පහත රූපසටහන්වල දැක්වේ. මෙහිදී සෑම ප්‍රතිලක්ෂණයටම සමාන ප්‍රමාණවලින් වියළූ ලද වීටිට පස් වර්ග හතරක් යොදා, ඒවාට සමාන ස්ල පරිමා ජලයක් කරන ලදී. එම පස් සාම්පලවලින් වැඩිම වැළි ප්‍රතිශතයක් අඩංගු පස් සාම්පලය ඇත්තේ කුමන ආවුරුමෙහි ද?



(1)



(2)



(3)




(4)

5. ශ්‍රී ලංකාව බෙදා හැකි කෘෂි පාරිසරික කලාප ගණන.

- (1) 7 කි. (2) 14 කි. (3) 27 කි. (4) 46 කි.

6. මෙම රූපයෙහි දැක්වෙන උපකරණය වන්නේ.

- (1) අන්වීක්ෂයකි.
(2) සූර්ය දීප්තමානයකි.
(3) අනිලමානයකි.
(4) ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානයකි.



7. ගොවියෙක් හම් වී වගාවෙන් ලැබෙන පියුරු ගවයන්ට ආහාර වශයෙන් ලබා දෙයි. එහි වෙසින්ගේ මල මුත්‍ර යොදාගනිමින් ජීව වායුව නිපදවන අතර ජීව වායු ඒකකයේ අතුරුඵල බෝග වගාව සඳහා පොහොරක් ලෙස භාවිත කරයි. මෙම ගොවිතැන් ක්‍රමය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

- (1) ගෞර්මාරු ගොවිතැන ලෙස ය. (2) සාරක්ෂණ ගොවිතැන ලෙස ය.
(3) සත්ත්ව බෝග මාරුව ලෙස ය. (4) සමෝධානික ගොවිතැන ලෙස ය.

8. බෝග වගාවට ආලෝකයේ බලපෑම සම්බන්ධ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

- A - දවසේ ආලෝකය පවතින කාලසීමාව සමහර ශාකවල පුෂ්පිකරණයට බලපායි.
B - රතු ආලෝකය බෝග ශාකවල අතු බෙදීමට හා බීජ ප්‍රරෝහණය කෙරෙහි බලපායි.
C - ආලෝක සිවුසාව වැඩි වන විට ශාක පත්‍රවල ප්‍රතිසා වැසි යාම සේතුවෙන් ප්‍රසාසංස්ලේෂණය වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ලම ය.

9. නිර්පාංක වගාවේ දී 'ඇල්බිඩි ඉවණය' භාවිත කරනුයේ,

- (1) පසේ ආම්ලිකතාව අඩු කිරීම සඳහා ය.
(2) බෝගවල පළිබෝධ පාලනය සිදුකිරීම සඳහා ය.
(3) බෝගවලට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දීම සඳහා ය.
(4) දඩු කැබලිවල මුල් ඇදීම උත්සේජනය කිරීම සඳහා ය.

10. යම් බෝගයක ජීවන චක්‍රය අවසන් වීමට පෙර එය පුෂ්පිකරණ අවස්ථාවේ දී තවත් බෝගයක් එම බෝග අතර සංස්ථාපනය කරමින් එකම කුසියක බෝග වර්ග දෙකක් හෝ කිහිපයක් වගා කිරීම හඳුන්වන්නේ,

- (1) මිශ්‍ර බෝග වගාව ලෙස ය. (2) සිහු බෝග වගාව ලෙස ය.
(3) කඩින් කඩ වගාව ලෙස ය. (4) අතුරු බෝග වගාව ලෙස ය.

11. පාංශු ජලය හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

- A - පස ජලයෙන් සංශාප්ත වූ විට එම පස තේලේතු ධාරිතාවට පත් වේ. X
B - කේශකාරීකරණ ජලය ශාක වර්ධනයට උපකාර වේ. ✓
C - උග්‍ර නියා තත්ත්වයක දී වූව ද පසේ පවතින ජලාකර්ෂක ජලය ඉවත් නොවේ. ✓

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි.

12. ශීතපෙකු විසින් තත්කාලී, පැපොල් හා වැල් දොවම් බීජ, ඵලවලින් වෙන් කළ ටියසම් තවාන් දමන ලදී. නමුත් ඒවා බොහෝ කාලයක් යනතුරු ප්‍රරෝහණය නොවී ය. මෙයට හේතුව විය හැක්කේ එම බීජවල

- (1) කලල පරිණත නොවී පැවතීම ය. (2) බීජාචරණ වාතය හා ජලයට අපාරග්‍රහණ වීම ය.
(3) කලල අක්‍රියව පැවතීම ය. (4) බීජාචරණවල උර්ධක නිශේධක ද්‍රව්‍ය පැවතීම ය.

13. කෝසා බෝවී බීජ සිවුරීමට පෙර රසිසෙකියම් බැක්ටීරියා අඩංගු මාධ්‍යයක් සමඟ මිශ්‍ර කරන ලදී. මෙසේ සිදු කරනු ලබන්නේ,

- (1) රෝග වැළඳීම වැළැක්වීමට ය.
(2) බීජ පුළුස්සාලා ඉවත් කිරීමට ය.
(3) නයිට්‍රජන් හිර කිරීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමට ය.
(4) කෘමි හානි වැළැක්වීමට ය.

14. පහත සඳහන් බෝග අතුරෙන් පොජිසේ (Poaceae) කුලයට අයත් බෝග අඩංගු කාණ්ඩය හඳුනා.

- (1) වී, පො ඉරිඟු පහ උණු ය. (2) ඉල් ඉරිඟු, කුරක්කන් පහ මු. ය.
(3) මේසෝටි, කල පහ කට්ටි ය. (4) ඉල් ඉරිඟු, කුරක්කන් පහ වී ය.

15. බෝග වගාවේ දී වැටීම පල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන පල සම්පාදන ක්‍රමය වන්නේ,
(1) නිරෝ පල සම්පාදනය යි, (2) බෝගේ පල සම්පාදනය යි.
(3) ඇලි පල සම්පාදනය යි, (4) පිටාර පල සම්පාදනය යි.
16. දිවියේ පල සම්පාදන ක්‍රමයේ වැඩි විවිධත්ව ප්‍රකාශ කළහත් පහත දැක්වේ.
A - මැවුම් භූමිවලට වුව ද සුදුසු ය.
B - උසින් වැඩි බෝග සඳහා සුදුසු ය.
C - පලය සමග පොහොර යෙදිය හැකි ය.
මෙවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ වන්නේ
(1) A පමණි, (2) A හා B පමණි, (3) A හා C පමණි, (4) B හා C පමණි.
17. නවත් පාත්තියක සම්මත පළල වන්නේ,
(1) 50 cm ය, (2) 100 cm ය, (3) 150 cm ය, (4) 200 cm ය.
18. යන්ත්‍ර ඔලයෙන් ක්‍රියාකාරන ද්විතියික බිම් කැපයීමේ උපකරණයක් වන්නේ,
(1) රොටේටරිය යි, (2) පපන් පරිවර්තක නගුල යි.
(3) හැඩ ලාලි නගුල යි, (4) හැටි නගුල යි.
19. බිතල හා රටකපු යන බෝග පිටුවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු පාත්ති වර්ගය කුමක් ද?
(1) උස් පාත්ති (2) වැටි හා කාණු
(3) ගිල් වූ පාත්ති (4) තනි වගා වලවල්
20. පහත සඳහන් පැළෑටි අතුරෙන් ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි වන්නේ,
(1) මානා හා විචලිතා ය, (2) මොණරකුටුම්භය හා පපන් පබර ය.
(3) ඇටවරා හා කලාඳුරා ය, (4) තාභිනියම් හා යෝධ නිදිකුම්භ ය.
21. කුකුළුබිඳීමේදී කුලයේ බෝග ගහන පත්‍රවලට හානි කරන කෘමි පළිබෝධකයා වන්නේ,
(1) බිත් කුරා ය, (2) අදුලකපෝරා ය, (3) පුරුක් පණුවා ය, (4) ලේට්බරඩ් කුරුමිණියා ය.
22. පිණිසක්කා සහ පැපොල් යන බෝගවලට වැළඳෙන පත්‍ර විවිඳ රෝගයේ රෝග කාරකය වන්නේ,
(1) බැක්ටීරියාවකි, (2) දිලීරයකි, (3) පෙරිසෝමි, (4) වට පණුවෙකි.
23. ටී වගාවක කැනින් කැන ගත යුතු පැහැ කැපවී, වියළි පිළිස්සීමට වාත්සාකාර ප්‍රදේශ දක්නට ලැබුණි. මෙයට හේතුවන පළිබෝධය වන්නේ,
(1) කොටම් කකුණ ය, (2) කුඩින්නා ය.
(3) පුහුරු පැළ පිටුවා ය, (4) පැළ කැන්නා ය.
24. පහත සඳහන් ගව වර්ග අතුරෙන් අක්කියා නිරි ගව වර්ගය කුමක් ද?
(1) පරිසි (2) අයර්කොට් (3) සිහඳි (4) නිලාරි
25. ප්‍රදේශය ගව වර්ගවල දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ මින් කුමක් ද?
(1) විශාල කැල්ල (2) උග මොල්ලිය
(3) දිගු ලෝම (4) පෙළඬිය හැකි හම
26. නිරි ගව පාලනයේ දී පෙරහන් කෝපිට පරිස්සාව සිදු කරන්නේ කුමන කෝපයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා ද?
(1) කුර හා පුළු පෝතය (2) පුළු පුළුතය
(3) රත්තාපුළු පෝතය (4) නිරි උණ
27. පත්තල ආහාර සලකා පිළිගෙල නිරිමේ දී කාබෝහයිඩ්‍රේට් පෝෂකය ලබාදීම සඳහා භාවිත කර ගැනීම ආහාර සංසරණයක් වන්නේ,
(1) බඩ අරිකු ය, (2) පොල් පුත්තක්කු ය, (3) පිප්පිකුටු කුඩු ය, (4) පෝත අත්තය ය.
28. වැසිරිගෙ පෙර කුරක්කන් පිප්පිලට පිහිටි වැටි මිද නිරිමේ ආශ්‍රිත වන්නේ,
(1) පිප්පිල ප්‍රදේශයට නවීනම් නිරිගෙ ය, (2) පිප්පිල ප්‍රදේශයට කුරක් පිප්පිල ය.
(3) කේන්ද්‍රයේ දී පිළිගෙල හානි අවම නිරිගෙ ය, (4) කේන්ද්‍රයේ පිප්පිලට මිද වැසිරිගෙ ය.

29. අවශ්‍ය අවස්ථාවක දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් නියමිත ගුණාත්මකයෙන් යුක්තව අවශ්‍ය ආහාර වර්ගයක් ලබාගැනීමට සාර්ථකවීමකට සතුට ඇති තැනියා ව හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 (1) ආහාර සම්පූර්ණතාව වශයෙනි. (2) ආහාර පරිවර්තනය වශයෙනි.
 (3) ආහාර සංරක්ෂණය වශයෙනි. (4) ආහාර පුරප්පාඩු වශයෙනි.
30. ශාක දළ කැබලි පූර්ව ප්‍රවාරයක් තුළ සිටුවීමෙන් වඩාත් සාර්වත්‍රව ප්‍රිල් අද්දවා නත හැකි ය. එසේ වන්නේ,
 (1) එය තුළ උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාව වැඩි නිසා ය.
 (2) එය තුළට වර්ෂා ජලය නොලැබෙන නිසා ය.
 (3) එය තුළට පළිබෝධවලට ඇතුළුවිය නොහැකි නිසා ය.
 (4) එය තුළ රැස්වන ජල වාෂ්ප මගින් වාතය සිසිල්වන නිසා ය.
31. වෙළෙඳපොළෙන් මිලදී ගන්නා ලද මාළු වින් එකක පතුලේ හා මුදුනේ, තහඩුව ඉදිමී පිටතට නෙරා තිබුණි. මෙයට හේතු විය හැක්කේ,
 (1) එය කල් ඉකුත් වී තිබීම ය. (2) එය තුළ ක්ෂුද්‍රජීවීන් වර්ධනය වී තිබීම ය.
 (3) එය සාන්ද්‍රීකරණයට ලක් කර තිබීම ය. (4) වින් එක තුළී තහඩුවලින් සාදා තිබීම ය.
32. පැයවීම මගින් ලබාගන්නා කිරි නිෂ්පාදනයක් වන්නේ,
 (1) උකු කිරි ය. (2) පැස්ටරීකෘත කිරි ය.
 (3) යෝගට් ය. (4) කිරි පිරි ය.
33. බෝග වර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂුද්‍ර පෝෂක වන්නේ,
 (1) නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ය. (2) කැල්සියම්, මැග්නීසියම් හා යකඩ ය.
 (3) කොපර්, සින්ක් හා කාබන් ය. (4) සින්ක්, මැංගනීස් හා මොලිබ්ඩිනම් ය.
34. මාළු පරිවර්තනය ක්‍රමයක් ලෙස කරවල නිෂ්පාදනයට වැදගත් හැකි ලැබේ. මෙහි දී යොදාගන්නා පරිවර්තණ ක්‍රමය වන්නේ,
 (1) විශුද්‍රීය ය. (2) විසිරි විශුද්‍රීය ය.
 (3) ජීවානුකරණය ය. (4) බලාත්විකරණය ය.
35. බෝගයක පත්‍ර දාරය කහ සාදා වී, පිළිස්සුන ස්වභාවයක් ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. මෙයට හේතුව විය හැක්කේ,
 (1) නයිට්‍රජන් උනතාවයි. (2) පොස්පරස් උනතාවයි.
 (3) පොටෑසියම් උනතාවයි. (4) මැග්නීසියම් උනතාවයි.
36. සෑම සත ඇස්වල නිරෝගීභාවයට හේතුවන විටමින් වර්ගය මින් කුමක් ද?
 (1) විටමින් A (2) විටමින් B (3) විටමින් C (4) විටමින් D
37. වී වගාවේ මතුපිට පොහොර ලෙස යොදා ගැනෙන බණ්ඩ පොහොර මිශ්‍රණයෙහි (TDM) අඩංගු වන ප්‍රධාන පෝෂක වන්නේ,
 (1) නයිට්‍රජන් හා පොටෑසියම් ය. (2) පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ය.
 (3) නයිට්‍රජන් හා පොස්පරස් ය. (4) නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ය.
38. තොට්ටොළු සතුන් පිළිබඳ සහන සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
 (1) ගව දෙනෙකුගේ හැඩ කාලය දින 30ක් වේ. ✓
 (2) මින්නර සඳහා කිසිදිනක් ඇති කිරීමේ දී දිනක් වශයෙන් පිට සති 8 වනතුරු කාල පිමාව ඇවිදු අවධිය ලෙස හඳුන්වයි.
 (3) ගව පැටවකුට ලබා දෙන කිරි ප්‍රමාණය උපරිම බරෙන් 20% ක් වේ.
 (4) සිසුම් ක්‍රමයට ගවයන් ඇති කිරීමේ දී ලැබෙන කිරි අස්වැන්නට වඩා වැඩි අස්වැන්නක් නිදැලි ක්‍රමයට ඇති කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි ය. ✗
39. ආහාර ඇතුළු භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මක පරික්ෂාගතයාම් සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ප්‍රමිති සහතිකය වන්නේ,
 (1) SLS ය. (2) IPNS ය. (3) ISO ය. (4) GAP ය.
40. ගැහිගත් ගව දෙනෙකුගේ 'විශුද්‍රීය කාලය' ආරම්භ කළ යුත්තේ ප්‍රසූතියට පොසම්භ කාලයට පෙර පිට ද?
 (1) මාසයක් (2) මාස දෙකක් (3) මාස තුනක් (4) මාස හතරක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2021(2022)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2021(2022)
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2021(2022)

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I, II
விவசாயமும் உணவுத் தொழில்பயனலும் I, II
Agriculture and Food Technology I, II

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය II

* පළමුවැනි ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළුව ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. තෙත් කලාපයේ වෙසෙන බෝග වගාව හා සත්ත්ව පාලනයේ නියැලෙන ගොවි මහතෙක් තම ගොවිපොළෙහි බෝග අවශේෂ, අතුරුදල හා සත්ත්ව මල ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කාබනික ගොවිතැනට යොමු වී සිටියි.
 - (i) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වගා කරන දෙක තම කරන්න.
 - (ii) (a) නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව සදහාම කරගෙන වගා කරන කර්තව්‍ය කුමක් ද?
(b) නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව ලැබෙන කාලසීමාව ලියා දක්වන්න.
 - (iii) (a) බෝග වගාවේ දී කඩාත් පාත්ති ජීවානුහරණය සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
(b) කඩාත් පාලවලට බහුලව වැළඳෙන රෝගයක් තම කරන්න.
 - (iv) (a) කඩාත් මිශ්‍රණය සකසා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය දෙක මොනවා ද?
(b) එම ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රකර ගත යුතු අනුපාතය සඳහන් කරන්න.
 - (v) (a) භූගත කඳන් සහිත වල් පැළෑටි වර්ග දෙකක් තම කරන්න.
(b) බෝග වගාවේ දී වල් පැළෑටි පාලනය සඳහා යොදාගත හැකි ශෂ්‍ය විදහාත්මක ක්‍රම දෙකක් ලියන්න.
 - (vi) (a) පසේ අඩංගු වන කලිල වර්ග දෙකක් ලියන්න.
(b) බෝග වගා භූමියක පස සංරක්ෂණය කර ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි යාන්ත්‍රික ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (vii) බෝග වගාව සඳහා කාබනික පොහොර යෙදීමේ වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (viii) රසායනික පළිබෝධනාශක වෙනුවට යොදා ගත හැකි පරිසර හිතකාමී පළිබෝධනාශක හතරක් නම් කරන්න.
 - (ix) ආහාර ඇසුරුම් කළ ඇති ලේබලයක අන්තර්ගත විය යුතු කරුණු හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (x) කුකුළන්ට වැළඳෙන කොන්සිඩියෝසිස් රෝගයෙහි රෝග කාරකය තම කරන්න.
2. කෘෂිකර්මාන්තයේ දී බෝග වගා කෙරෙන ප්‍රධාන උපස්ථරය හෙවත් වගා මාධ්‍යය වන්නේ පසයි.
 - (i) (a) පාංශු සංකටක හතරක් තම කරන්න.
(b) පාංශු බිනිස් ද්‍රව්‍ය ජීවයේ විෂකම්භය ද සමඟ වර්ග කර දක්වන්න.
 - (ii) පාංශු වයනයේ කෘෂිකාර්මික වැදගත්කම හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) (a) පාංශු බාදනය යනු කුමක් ද?
(b) පාංශු බාදන කාරක දෙකක් තම කරන්න.
(c) පාංශු බාදනය නිසා සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵල තුනක් ලියන්න.

3. ජලය සීමිත සම්පතක්වන බැවින් එය මතු පරපුර වෙනුවෙන් මනාව කළමනාකරණය කළ යුතු වේ.
- බෝග වගාවේ දී ජල සම්පාදනය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?
 - පෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදන ක්‍රම තුනක් සඳහන් කර, ඒවා අතුරෙන් ඔහු වාර්ෂික පලතුරු බෝග සඳහා සුදුසු ජලසම්පාදන ක්‍රමයක් නම් කර එය රූපසටහනක් ඇසුරෙන් පෙන්වන්න.
 - වගා භූමියක දුර්වල ජලවහනය නිසා සිදුවන අයහපත් බලපෑම් තුනක් සඳහන් කරන්න.
4. පළිබෝධ හානිය බෝග වගාවේ ඵලදායිතාව අඩුවීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයකි.
- (a) ඉල් මැස්සා හානි කරන බෝග වර්ග හතරක් ලියන්න.
 - (b) ඉල් මැස්සාගෙන් බෝගවලට සිදුවන හානිය සඳහන් කරන්න.
 - (a) වල් පැළෑටි නිසා බෝගවලට සිදුවන හානි හතරක් ලියන්න.
 - (b) වගා ක්ෂේත්‍රයක වල් පැළෑටි ඇතිවීම වළක්වන ක්‍රම හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - සොලනේසියේ තුලයේ බෝගවලට වැළඳෙන නිට්‍රොජන් රෝගයේ,
 - රෝග කාරකය
 - රෝග ලක්ෂණ හා
 - රෝගය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් දක්වන්න.
5. වර්ගයා බෝ කිරීමට භාෂ සතු හැකියාව උපයෝගී කරගනිමින් වගා කටයුතුවලට අවශ්‍ය රෝගයේ ද්‍රව්‍ය නිපදවා ගත හැකි ය.
- (a) වර්ධක ප්‍රචාරණය සතු කුමක් ද?
 - (b) වර්ධක ප්‍රචාරණයේ වාසි හතරක් ලියන්න.
 - වැඩි දියුණු කරන ලද නව වී ප්‍රභේදයක දත්තව ලැබෙන යහපත් ලක්ෂණ හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - පොළොව මට්ටමට නැඹිය හැකි සමන්විතව අත්තන සරල භූමි අතු බැඳීම සිදුකරන ආකාරය නම් කළ රූපසටහනක් ආධාරයෙන් විස්තර කරන්න.
6. ආහාර නරක්වීම නිසා ඒවා අපෝෂ්‍යයක් බැවින් අහිමයේ සිට මිනිසා ආහාර පරිවර්ණය ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට පුරුදු වී ඇත.
- (a) ආහාර නරක්වීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?
 - (b) ආහාර නරක්වීම හෙරෙඩි බලපාන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.
 - ආහාර පරිවර්ණයේ වැදගත්කම් තුනක් සඳහන් කරන්න.
 - ආහාර පරිවර්ණය ක්‍රම තුනක් සඳහන් කර එම එක් එක් ක්‍රමය සඳහා උදාහරණයක් බැගින් ලියන්න.
7. උසස් නිෂ්පාදන හැකියා සහිත ගොවිපොල සත්ත්ව වර්ග ඇතිකිරීමට සුදුසු විවිධ දේශගුණික කලාප පවතින බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය දියුණු කිරීමට විභවයක් පවතී.
- සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හඳුනාගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ දත්තව ලැබෙන ප්‍රධාන ගව පාලන කලාප හතරක් නම් කරන්න.
 - (a) ආහාරවල අඩංගු කන්ක ප්‍රමාණය මත සත්ත්ව ආහාර වර්ග කප ඒවාට උදාහරණ දෙක බැගින් දෙන්න.
 - (b) ඉපදුණු විකස ගව පැටවකුට සිදු කළ යුතු සත්කාර දෙකක් ලියන්න.
 - (a) කන ආස්තරණ ක්‍රමයට කුකුළන් ඇති කිරීමේ වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) කන ආස්තරණ ක්‍රමයේ දී අතුරුලැබුණු ලෙස ගොදා හැකීමට සුදුසු ද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න.